



26. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 06.05.2021 12:20 - Zaključeno



Fenološki razvoj

Na območju Celjske regije jabolane povprečno na opazovane lokacije in sorte prehajajo v fenološko fazo konca cvetenja BBCH 69. Sorte, ki zgodaj cvetijo (Carjevič, Idared...) in hruške so cvetenje že zaključile.

Sorta	Razvojna faza	
	Fleckinger	BBCH
Carjevič, Idared Braeburn,	H	69
Gala, Jonagold, Fuji, Zlati delišes; Elstar	G (10-20%) – H (80-90%)	67 (10-20%)-69(80-90%)

Na območju Koroške so jabolane v fazi začetka, hruške pa v fazi polnega cvetenja.

Škrlup in pepelasta plesen jabol

V zadnjih desetih dneh so bili na opazovanih sadjarskih lokacijah dvakrat izpolnjeni pogoji za okužbo s škrlupom: med 27. in 28.4. aprilom za srednjo oz. močno okužbo in je med 1. in 3. majem na vseh lokacijah za močno okužbo. Tudi v naravi smo ob izpolnjenih pogojih za obe okužbi zabeležili zelo močne izbruhe askspor. Ob padavinah, ki so se začele v noči iz 5. na 6. maj in še tajajo ter napovedjo nadaljevana nestanovitnega vremena do sobote (8.5.) pričakujemo izpolnjene pogoje za nove okužbe.

Poleg deževnega vremena preventiven pristop zaščite proti škrlupu ovira še veter, ki otežuje optimalno izvedbo aplikacije. V kolikor vam bodo vremenske razmere dovoljevale nadaljujte s preventivnim pristopom škropljenja in uporabo pripravkov na osnovi a.s. ditianon kot so: **Delan Pro** (2,5 L/ha), **Alcoban** (0,75kg/ha) ali **Delan 700 WG** (0,75 kg/ha). V primeru, da bo listje skupaj mokro več kot dva dni in bo padlo več kot 20 mm dežja, pa svetujemo uporabo sistemskih IBE pripravkov na osnovi aktivne snovi difenkonazol kot so: **Score 250 EC** (0,2 L/ha), **Difcor 250 EC** (0,2 L/ha), **Mavita 250 EC** (0,2 L/ha), **Difenzone** (0,2 L/ha- od BBCH 71) ali tetrakonazol **Domark 100 EC** (0,4 l/ha - od BBCH 69) v kombinaciji s kontaktnimi fungicidi. V nasadih, kjer opažate močnejši pojav jabolne pepelovke lahko v kombinaciji s kontaktnim fungicidom, date prednost tudi pripravku: **Sercadis plus** (kombinacija a.s. difenkonazol in fluksapiroksad), ki deluje hkrati na obe bolezni. Ob ustalitvi vremena pa v nasadih, ki so močno okuženi s pepelasto pesnijo svetujem tudi dodajanje pripravkov kot sta: **Luna experience** (0,75 L/ha) ali **Sercadis** (0,25 L/ha). Sercadis ima delovanje tudi na škrlup. Prav tako je smiselna uporaba sicer registriranih pripravkov na osnovi strobilurinov kot so: **Stroby WG** (0,2 kg/ha), **Flint** (0,15 kg/ha), **Zato 50 WG** (0,15 kg/ha) ali **Terceel** (2,5 kg/ha), ki pa žal niso prisotni na trgu.

V ostalih nasadih za zmanjšanje infekcijskega potenciala dodajate enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla kot so: **Azumo WG**, **Cosan**, **Pepelin**, **Kumulus DF**, **Microthiol special**, **Microthiol disperss**, **Thiovit jet**, **Vindex 80 WG**, **Biotip Sulfo 800 SC**, **Pol sulphur 800 SC** ali **Symbiotica Fito –tekoče žveplo** ali **Vertipin**, v odmerku 3 kg/ha oz. 3L/ha.

Enaka strategija škropljenja proti škrlupu in pepelasti plesni velja tudi za hruške.

Jabolčna grizlica

Na opazovanih lokacijah so ulovi jabolčne grizlice na belih lepljivih ploščah še vedno maloštevilni, neenakomerni in pod pragom škodljivosti (prag škodljivosti: skupno 30 in več grizlic na posamezno ploščo). Ob končanem cvetenju opravite pregled plodičev na prisotnost poškodb. Prag škodljivosti je dosežen, ko je poškodovanih 3% plodičev. Poškodbe v obliki luknjic, ki jih z leglico izvrta osice v cvetne čaše preden odložijo jajčeca so vidne kot majhne temne pege. V primeru preseganja pragov škodljivosti, **ko je cvetenje jabol popolnoma zaključeno**, opravite škropljenje s pripravkom **Neemazal T/S** (1,5 L/ha na meter višine krošnje) ali **Mospilan 20 SG** (0,04 %).

Vsi omenjeni pripravki delujejo tudi na **listne uši** ter **sadnega listnega duplinarja**, kažejo pa tudi dober stranski učinek na **stenice**, ki so pogoste v nasadih v bližini gozdov.

Opozorilo: **Zaradi zaščite čebel in drugih opravevalcev se med cvetenjem gojenih rastlin in podrast ne sme tretirati s sredstvi, ki so nevarna oz. strupena za čebele. Zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele pred njihovo uporabo še posebej pozorno preberite priložena navodila za uporabo! V primeru uporabe sredstev, ki so nevarna za čebele je pred škropljenjem potrebno po mulčiti oziroma pokositi podrast in škropljenje opraviti ponoči, ko so čebele v panjih. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.**

Krvava uš

V zadnjem tednu aprila se je začela migracija krvave uši na koreninskem vratu. Prav tako opazimo aktivnost krave uši na dve in tri letnem lesu in začetek migracije na enoletne poganjke.

O dinamiki razvoja in optimalnem času zatiranja vas bomo sproti obveščali.

Jabolčni zavijač

Na feromonskih vabah smo prvega metuljčka ulovili 26 aprila. Na vseh opazovanih sadjarskih lokacijah pa smo prve ulove zabeležili med 30. aprilom in 2. majem. O dinamiki razvoja in strategiji zatiranja vas bomo sproti obveščali.

Datum objave obvestila: 06.05.2021 12:20

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Pripravila: **Alenka Ferlež-Rus**

[Seznam registriranih FFS](#)



MKGP-UVHVR | Izjava o dostopnosti | FITO-INFO | NEOX s.p., 2014 | BRON d.o.o. © 2024