

43. VARSTVO VINSKE TRTE - 15.06.2021 13:13 - Zaključeno



Fenološki razvoj vinske trte

Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske doline je vinska trta v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi BBCH 57 (socvetja popolnoma razvita, cvetovi ločeni) in pri sortah, ki so hitrejše v razvoju (Chardonnay, Beli Pinot, Rumeni muškat) prehaja v fazo BBCH 60 (prve cvetne kapice odstopajo od cvetne osnove) do začetka cvetenja BBCH 61 (okoli 10 % cvetnih kapic odpadlo).

Peronospora in oidij vinske trte

V tem času vinska trta bujno raste. Zato pazite na razmike med škropljenji. Ti naj ne bodo daljši od 8 do 10 dni. Poskrbite, da bo listna masa stalno zaščitena. Škropljenje opravite z enim od kombiniranih, sistemsko ali polsistemsko delujočih pripravki kot so: **Forum star** (1,6 kg/ha), **Sfinga Exstra WDG** (1,5 kg/ha), **Forum MZ WG** (2,5 kg/ha), **Acrobat MZ** (2,5 kg/ha), **Sanvino** (0,75 kg/ha), **Orvego** (0,8 L/ha), **Mikal flash** (4 kg/ha), **Mikal premium F** (3 kg/ha), **Momentum trio** (3kg/ha) ali **Magma triple WG** (3kg/ha).

V primeru, da od zadnjega škropljenja **ni mililo** več kot osem dni, lahko opravite škropljenje tudi s pripravki kot so: **Folpan gold** (2 kg/ha), **Ridomil Gold MZ Pepite** (2,5 kg/ha), **Armel M** (2,5 kg/ha), **Ampexio** (0,5 kg/ha), **Electis 75 WG** (1,5 – 1,8 kg/ha), **Reboot** (0,4 kg/ha), **Moximate 725 WG** (1,9 kg/ha), **Profilux** (2 kg/ha), **Nautil DG** (2,4 kg/ha), **Fortuna gold** (3 kg/ha), **Fudan gold** (3 kg/ha), **Cymbal** (0,25kg/ha), **Twingo** (3 kg/ha), **Valis F** (2 kg/ha) ali **Valis M** (2 kg/ha).

Pripravku **Cymbal** priporočamo dodati polovični odmerek enega od kontaktnih fungicidov.

Uporabite lahko tudi pripravka na osnovi kalijevega fosfonata **Sorale LX** oz. **LBG -01F34** (4 L/ha- pri samostojni rabi ali 3 L/ha – pri kombinirani uporabi s fungicidi na osnovi a.s. folpan ali mankozeb) ali **Delan pro** (3L/ha). Pri uporabi slednjih prilagodite razmik med škropljenji količini padavin in pazite, da razmik med škropljenji ne bo daljši od 7 dni.

Toplo vreme z visoko nočno in jutranjo relativno zračno vlago ustvarja ugodne pogoji oz. povečanje nevarnosti za okužbe z **oidijem vinske trte**. Za preprečevanje okužb priporočamo uporabo enega od naslednjih pripravkov: **Collis** (0,4 L/ha), **Luna Experience** (0,375 L/ha), **Luna max** (1L/ha), **Talendo extra** (0,08 – 0,2 L/ha), **Talendo** (0,25 L/ha), **Vivando** (0,16 L/ha), **Custodia** (0,35 L/ha), **Domark 100 EC** (0,3 L/ha) **Misha 20 EW** (0,23 L/ha), **Systhane 20 EW** (0,14 L/ha), **Karathane Gold 350 EC** (0,5 L/ha), **Kusabi 300 SC** (0,25 L/ha), **Dynali** (0,65 L/ha) **Topas 100 EC** (0,3L/ha), **Topaze** (0,3 L/ha), **Score 250 EC** (0,2 L/ha), **Mavita 250 EC** (0,2 L/ha), **Difcor 250 EC** (0,12 L/ha), **Spirox D** (0,5 L/ha), **Sercadis** (0,15 L/ha), **Unicorn DF** (2,2 kg/ha), **Prosper CS 300** (1L/ha), **Nativo 75 WG** (0,16kg/ha) ali uporabite pripravke, ki vsebujejo samo aktivno snov tebukonazol kot so: **Folicur EW 250** (0,4 L/ha), **Orius 25 EW** (0,4 L/ha), **Mystic 250 EC** (0,4 L/ha.), **Tebusha 25%EW** (0,4 L/ha), **Baltazar** (0,4 L/ha) ali **Star Tebukonazol** (0,4 L/ha).

Uporabite lahko tudi pripravek **Cabrio Top** (2,0 L/ha), ki deluje tudi na peronosporo vinske trte.

Za zmanjševanje okužb proti oidiju lahko uporabite tudi pripravka na osnovi kalijevega hidrogen karbonata kot sta: **Vitisan** (6 kg/ha) ali **Karbicure** (5kg/ha), ki sta registrirana tudi v ekološki pridelavi.

Prav tako lahko dodate pripravke na osnovi močljivega žvepla kot so: **Cosan**, **Kumulus DF**, **Microthiol special**, **Microthiol disperss**, **Pepelin**, **Thiovit Jet** ali **Vindex 80 WG** - v odmerku 3 do 8 kg/ha ali **Biotip Sulfo 800 SC**, **Pol- Sulphur 80 WG**, **WP**, **Pol- Sulphur 800 SC**, **Symbiotica fito – granulirano žveplo**, **Symbiotica fito – tekoče žveplo** - v odmerku 4L - kg/ha ali **Azumo WG** v odmerku 4-8 kg/ha ali **Cosavet DF**, **Močljivo žveplo Karsia DF** v odmerku do 3,6-8 kg/ha. Ob pojavu okužbe lahko uporabite tudi **Cosinus** v odmerku 8 kg/ha.

Ameriški škržatek

V vinogradih prevladujejo ličinke L1 razvojnega stadija. Prisotne so tudi prve ličinke L2 razvojnega stadija. O rokih zatiranja in uporabi primernih insekticidov vas bomo pravočasno obvestili.

V primeru toče dajte pri škropljenju prednost pripravkom, ki vsebujejo aktivno snov **folpet** kot so: **Forum star**, **Sfinga Exstra WDG**, **Folpan gold**, **Valis F**, **Twingo**, **Sanvino**, **Mikal flash**, **Mikal premium F**, **Momentum trio** ali **Magma triple WG**.

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Pripravi/a: **Alenka Ferlež-Rus**

Seznam registriranih FFS



MKGP-UVHVR | Izjava o dostopnosti | FITO-INFO | NEOX s.p., 2014 | BRON d.o.o. © 2024