

90. OBVESTILO O VARSTVU HRUŠK IN JABLAN - 16.07.2021 11:50 - Zaključeno



Jabolčni zavijač (*Cydia pomonella*)

V minulem tednu je bil velik jabolčnega zavijača v Brkinih in na Tolminskem. Prag škodljivosti (10 metuljčkov/feromonsko vabo/teden) je bil presežen na lokacijah Zavrhek, Tatre, Beka in Volče. V Vipavski dolini in Slovenski Istri so bili ulovi jabolčnega zavijača majhni.

Škropljenje proti jabolčnemu zavijaču svetujemo na lokacijah, kjer je presežen prag škodljivosti in je od zadnjega škropljenja minilo več kot 14 dni.

Za zatiranje jabolčnega zavijača so registrirani naslednji insekticidi:

Fitofarmacevtsko sredstvo	Aktivna snov	Odmerek / konc.	OPOMBE:
Affirm	emamektin	1 kg/ha/m višne krošnje max. 4,0 kg/ha	
Afirm opti	emamektin	2,0 kg/ha	
Coragen	klorantraniliprol	0,27 L/ha	
Delegate 250 WG	spinothram	0,3 kg/ha	
Exirel	ciantraniliprol	0,9 L/ha	
Insegar 25 WG	fenoksikarb	0,6 kg/ha	Deluje tudi na ličinke ameriškega kaparja (<i>Quadrastpidiotus perniciosus</i>)
Imidan 50 WG	fosmet	1 kg/ha	Delno učinkovito deluje na ličinke marmorirane smrdljivke (<i>Halyomorpha halys</i>)
Laser plus	spinosad	0,3 L/ha	
Mimic	tebufenozid	0,9 – 1,0 L/ha	
Mospilan 20 SG	acetamiprid	0,05 % Max. 0,5 kg/ha	Dobro deluje na ličinke in odrasle osebkne marmorirane smrdljivke (<i>Halyomorpha halys</i>)
Steward	indoksakarb	0,017 % oz. 225 g/ha	Dobro deluje na ličinke marmorirane smrdljivke (<i>Halyomorpha halys</i>)

Poleg zgoraj naštetih sredstev lahko za zatiranje jabolčnega zavijača uporabite tudi pripravke: **Agree WG** v odmerku 1 kg/ha, **Lepinox plus** v odmerku 1 kg/ha, **Carpovirusine** v odmerku 1L/ha ali **Madex Max** v odmerku 0,05 L/ha/1 m višine krošnje. Naštetih pripravki spadajo v skupino biotičnih sredstev oz. bioloških insekticidov, katerih uporaba je dovoljena tudi v ekološki pridelavi sadja. Ker imajo krajše delovanje in so podvrženi hitremu razpadu, je potrebno škropljenje opraviti v večernem času. V primeru padavin oz. močnega sončnega obsevanja, je priporočljivo škropljenje ponoviti.

Pri uporabi čebelar nevarnih sredstev, je potrebno odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 16.07.2021 11:50

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: ROT Mojca

Pripravila: **Mojca Rot**

[Seznam registriranih FFS](#)



[MKGP-UVHVR](#) | [Izjava o dostopnosti](#) | [FITO-INFO](#) | [NEOX s.p.](#), 2014 | [BRON d.o.o.](#) © 2024