

106. OBVESTILO O VARSTVU HRUŠK IN JABLAN - 20.08.2021 12:57 - Zaključeno



Hruške in jabolane na Primorskem so v fazi zorenja BBCH 81- 85.

Skladiščne bolezni in škrlup

Zaključna škropljena so namenjena preprečevanju razvoja skladiščnega škrlupa in ostalih skladiščnih bolezni (mušja pegavost, sajavost jabolk, grenka gniloba, siva plesen,...). Izbiro sredstev prilagodite sortimentu vaših nasadov, pri tem dosledno upoštevajte karenčne dobo.

JABLANE	HRUŠKE	Odmerek / konc.		Karenca
Sredstvo				
Zato 50 WG	-	0,1- 0,15 kg/ha	21 dni	
Luna experience	Luna experience	0,75 L/ha	14 dni	
Bellis	Bellis	0,8 kg/ha	7 dni	
Pomax	Pomax	1,6 L/ha	5 dni	
Geoxe	Geoxe	0,45 kg/ha	3 dni	
Switch 62,5 WG	Switch 62,5 WG	1,0 kg/ha	3 dni	
Vitisan	-	2,5 kg/ha	1 dan	
Amylo – X		1,5 – 2,5 kg/ha	karenca ni potrebna	

Jabolčni zavijač

V zadnjem tednu smo na lokaciji Dombrova v spodnji Vipavski dolini zabeležili zelo velik ulov jabolčnega zavijača. Prag škodljivosti je bil presežen tudi na lokaciji Čelje v Brkinih. Jabolčni zavijač lahko povzroči pomembno škodo na plodovih tudi v zadnjem obdobju zorenja, zato svetujemo, da na lokacijah kjer je presežen prag škodljivosti opravite škropljenje. Za ta namen uporabite insekticide s krajšo karenco kot so: **Affirm** v odmerku **4,0 kg/ha**, **Affirm Opti** v odmerku **2,0 kg/ha**, **Delegate 250 WG** v odmerku **0,3 kg/ha**, **Laser plus** v odmerku **0,3 L/ha** ali pripravek **Steward** v odmerku **225 g/ha**. Vsi naštet pripravi imajo 7 dni karence.

Poleg naštetih sredstev lahko za zatiranje jabolčnega zavijača uporabite tudi pripravke: **Agree WG** v odmerku 1 kg/ha, **Lepinox plus** v odmerku 1 kg/ha, **Carpovirusine** v odmerku 1L/ha ali **Madex Max** v odmerku 0,05 L/ha/1 m višine krošnje. Naštet pripravki spadajo v skupino biotičnih sredstev oz. bioloških insekticidov, katerih uporaba je dovoljena tudi v ekološki pridelavi sadja. Ker imajo krajše delovanje in so podvrženi hitremu razpadu, je potrebno škropljenje opraviti v večernem času. V primeru padavin oz. močnega sončnega obsevanja, je priporočljivo škropljenje ponoviti.

Pri uporabi čebelar nevarnih sredstev, je potrebno odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 20.08.2021 12:57

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: ROT Mojca

Pripravila: **Mojca Rot**

Seznam registriranih FFS

