



77. VARSTVO KOŠČIČARJEV - 05.11.2021 13:45 - Zaključeno



Koščičaste sadne vrste so zaključile fazo intenzivnega odpadanja listja. Rane, ki pri tem nastajajo so vdorna mesta za okužbe z boleznimi lesa kot sta **ožig breskove skorje** in **breskov rak**. Bolezenska znamenja prepoznamo po sušenju in smoljenju vej.

Predvsem v starejših intenzivnih nasadih breskev in sliv je smiselno za zatiranje **ožiga breskove skorje** kot **rakastih obolenj koščičarjev** uporabiti pripravek **Delan 700 WG** (0,75 kg/ha), ki poleg omenjenih bolezni na breskvah, nektarinah, marelicah, slivah in češpljah zatira še listne pegavosti kot so **listna luknjičavost koščičarjev**, **češnjeva listna pegavost** in **češpljeva rdeča listna pegavost**. Zato lahko z njim poškropite tudi češnje in višnje.

Prav tako lahko za omejevanje naštetih bolezni uporabite enega od bakrovih pripravkov. Vloga le teh je razkuževalne narave in kažejo tudi dobro stransko delovanje na boleznih lesa kot sta ožig breskove skorje in breskov rak. Škropljenje lahko opravite z enim od pripravkov na osnovi bakra kot so: **Badge WG** (3,5 kg/ha breskev, nektarina, marelica, češnja, višnja, sliva), **Cuprablau Z 35 WP** (3 kg/ha – breskev, nektarina), **Cuprablau Z 35 WG** (1,6 – 2 kg/ha – breskev, marelica, češnja, sliva), **Champion 50 WG** (2 – 3 kg/ha – češnja, višnja, marelica, sliva, češplja) ali **Nordox 75 WG** (2 kg/ha – breskev, nektarina).

Pazite, da z bakrovimi pripravki ne škropite pri zelo nizkih temperaturah. Te naj bodo enake ali višje od 5 °C.

Datum objave obvestila: 05.11.2021 13:45

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Pripravila: **Alenka Ferlež-Rus**

[Seznam registriranih FFS](#)

