

3. Varstvo nektarin in breskev - 21.03.2022 13:20 - Zaključeno



V sedanjih razmerah je fenološki razvoj koščičarjev različen, odvisen od vrste, sorte in mikrolokacije. V toplejših območjih in legah zgodnje sorte breskev in nektarin že brstijo, med tem ko na hladnih legah še mirujejo. Kljub lepemu vremenu in odsotnosti padavin, ki so nujno potrebne za okužbe **z breskovo kodravostjo**, pridelovalcem svetujemo, da v času brstenja opravijo škropljenje z enim od bakrovih pripravkov (**Cuprablau Z 35 WG, Nordox 75 WG, Badge WG**).

S preventivnim škropljenjem z bakrovimi pripravki dosežemo razkuževalni učinek v nasadih in zmanjšamo inokulum različnih glivičnih in bakterijskih povzročiteljev bolezni. Pozorni bodite, da v času škropljenja nočne temperature ne padejo po 0°C

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Datum objave obvestila: 21.03.2022 13:20

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: David Snoj, Primož Žigon, Meta Zemljič

Pripravili: **David Snoj, Primož Žigon. Uredila: Meta Zemljič**

[Seznam registriranih FFS](#)

