# 9. OBVESTILO O ZATIRANJU ŠKODLJIVCEV NA OLJNI OGRŠČICI - 25.03.2022 10:38 - Zaključeno

V SV Sloveniji je oljna ogrščica v razvojni fazi podaljševanje stebla BBCH 33, na nekaterih lokacijah so že prisotni cvetni brsti. Zaradi sušnih razmer ogrščica zaostaja v rasti oziroma počasi napreduje. Od škodljivcev se v rumene posode lovijo stebelni kapusov kljunotaji (manjši 3-4 mm, z belo pego na pokrovkah), ogrščični kljunotaji (večji nad 5 mm, celi črni) in tudi že repičar. **Največ se sedaj lovi ogrščičnih kljunotajev, kjer je prag škodljivosti nižji, znaša 5 kljunotajev na tri dni. Na večini lokacijah so pragovi škodljivosti preseženi, zato priporočamo zatiranje kljunotajev.**

Podatki o ulovu kljunotajev in repičarjev so prikazani v spodnji preglednici:

**KLJUNOTAJI**

Škodo povzročajo ličinke kljunotajev, zavrtajo se v steblo, s tem se zmanjša prevodnost vode in hranilnih snovi po rastlini, posledično se zmanjša pridelek. Kljunotaji se začnejo pojavljati zelo zgodaj spomladi, ko se dnevne temperature dvignejo nad 10°C, temperature tal na 2 cm pa nad 6°C. Priporočamo, da na svojih posevkih ogrščice spremljate nalet kljunotajev s pomočjo rumenih posod v katere se nalije voda in se pregleduje na tri dni. Lahko se nastavijo tudi rumene lepljive plošče, ali se jih opazuje na rastlinah.

**PRAGOVI ŠKODLJIVOSTI pri kljunotajih so:**

- velik **Ogrščični (repični) kljunotaj (*Ceutorhynchus napi*): 5 hroščev/posodo na 3 dni,**
- majhen **Stebelni kapusov kljunotaj (*Ceutorhynchus quadrienz*): 15 hroščev/posodo/ 3 dni**

Kjunotaje je potrebno zatreti v nekaj dneh, ko je presežen prag škodljivosti.

**Preglednica 2: Seznam insekticidov registriranih za oljno ogrščico**

| SREDSTVO | ODMEREK | ČAS UPORABE | REGISTRIRAN ZA SLEDEČE ŠKODLJIVCE |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **PIRETROIDI TIPA I** | | | |
| **Evure**<br>(Tau-fluvalinat 24%) | 0,2 L/ ha | Tretira se ob pojavu škodljivih žuželk, ko je presežen prag škodljivosti | za zatiranje **repičnega kljunotaja** (Ceutorhynchus napi), **stebelnega in črnega kapusovega kljunotaja** (Ceutorhynchus quadridens, C. picitarsis), **repičarja** (Meligethes aeneus), **redkvinega kljunotaja** (Ceuthorhynchus assimilis), **repičnega bolhača** (Psylliodes chrysocephala) in **kapusove luskove hržice** (Dasyneura brassicae). |
| **Mavrik 240 EW**<br>(tau-fluvalinad 24%) | 0,2 L na ha | insekticid z kontaktnim in želodčnim delovanjem. Tretira se, ko je presežen gospodarski prag škode | - za zatiranje **repičnega kljunotaja** (Ceutorhynchus napi), **stebelnega in črnega kapusovega kljunotaja** (Ceutorhynchus quadridens, C. picitarsis), **repičarja** (Meligethes aeneus), **redkvinega kljunotaja** (Ceuthorhynchus assimilis), **repičnega bolhača** (Psylliodes chrysocephala) in **kapusove luskove hržice** (Dasyneura brassicae) |
| | | | |
| **PIRETROIDI TIPA II** | | | |
| | | | |
| | | | |
| **Decis 2,5 EC** | 0,3 L/ha | dotikalni insekticid,s sredstvom se prvič tretira, ko | -za zatiranje **repičarja** (Meligethes aeneus) in **drugih škodljivcev** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (deltametrin 2,5 %) | | je presežen prag škodljivci | |
| **Decis 100 EC**<br>(deltametrin 10 %) | 63 ml - 75 ml/ha | Tretiranje se opravi ob pojavu škodljivih žuželk oziroma ko je presežen prag škodljivosti | -za zatiranje **repičarja** (Meligethes aeneus) in za zatiranje **repičnega bolhača** (Psylliodes chrysocephala) |
| **Fastac 100 EC**<br>(alfa-cipermetrin 10%)<br>**Zaloge v uporabi do 30.4.2022** | 0,1 L/ha | dotikalni in želodčni insekticid. Tretira se, ko je presežen prag škode, pri čemer je potrebno upoštevati karenco. Ne priporoča se tretiranja nad 25 °C. | -za zatiranje **repnega bolhača** (Psylliodes chrysocephala), **kljunotaja** (Ceutorhynchus picitarsis), **luskovega kljunotaja** (Ceutorhynchus assimilis), **kapusove luskove hržice** (Dasineura brassicae) in **repičarja** (Meligethes aeneus). |
| **Fasthrin 10 EC**<br>(alfa-cipermetrin 10%)<br>**(zaloge v uporabi do 7.12.22)** | 0,1 L/ha ob porabi 200 do 500 L vode na ha. | S sredstvom se tretira v razvojni fazi, ko so prisotni cvetni brsti še vedno obdani z listi (BBCH50), do razvojne faze,ko so vidni prvi venčni listi, cvetni brsti so še vedno zaprti –rumeni brst (BBCH 59) | - za delno zmanjševanje populacije **repičarja** (Meligethes aeneus) |
| **Karate zeon 5 CS**<br>(lambda-cihalotrin 5%) | 0,15 L na ha | dotikalni insekticid z želodčnim in odvračalnim delovanjem, se sredstvo uporabi ob prvem pojavu škodljivih žuželk. | -za zatiranje **listnih uši** (Aphididae), **kljunotaja** (Ceutorhynchus spp.) in **repičarja** (Meligethes aeneus) ter **drugih grizočih žuželk** |
| **Karis 10 CS**<br>(lambda-cihalotrin 10%)<br>**(zaloge v uporabi do 5.11.22)** | 75 mL/ha | Tretira se v času cvetenja, ko populacija semenskega kapusovega kljunotaja doseže prag gospodarske škode. | za zatiranje **semenskega kapusovega kljunotaja** (Ceutorhynchus assimilis) in **kapusove luskove hržice** (Dasineura brassicae). |
| **Poleci**<br>(deltametrin 2,5 %) | 0,3 L/ha | dotikalni (kontaktni) in želodčni insekticid. S sredstvom se prvič tretira, ko je presežen prag škodljivosti oziroma v skladu z napovedjo opazovalno službe | -za zatiranje **repičarja** (Meligethes aeneus) in **drugih škodljivcev** |
| | | | |
| **Kontakni insekticid z drugačnim načinom delovanja** | | | |
| **Sindoxa**<br>(indoksakarb 30%) | 0,085 kg/ha, pri porabi vode od 400 do 600 L/ha. | S sredstvom se tretira v razvojni fazi od prvih vidnih cvetnih brstov (BBCH 51) do prvih vidnih venčnih listov (BBCH 59). | -v oljni ogrščici za zatiranje **repičarja** (Meligethes aeneus) in **drugih škodljivcev** |
| **Steward OPZ**<br>(indoksakarb 30%) | 85 g/ha pri porabi vode 150 – 400 L/ha. | S sredstvom se tretira ob pojavu škodljivih žuželk, v razvojni fazi od pojava socvetja do začetka cvetenja (BBCH 51 - 59). | -v oljni ogrščici za zatiranje **repičarja** (Meligethes aeneus) |

**BOLEZNI NA OLJNI OGRŠČICI**

Zaradi sušnih razmer trenutno ni pogojev za razvoj bolezni, zato odsvetujemo uporabo fungicidov.

Pred uporabo posameznih fitofarmacevtskih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo. Upoštevati je potrebno predpisane razdalje od voda 1. in 2. reda. Upoštevajte dobro kmetijsko prakso varstva rastlin s poudarkom na varovanju čebel ter na vodenje evidenc o uporabi fitofarmacevtskih

sredstev, ki jih je treba hraniti tri leta. Hraniti morate tudi račune o nabavi sredstev za varstvo rastlin. Evidence in račune morate hraniti tri leta, vključeni v KOPOP pa pet let.

Datum objave obvestila: 25.03.2022 10:38
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: **Jože Miklavc**
Seznam registriranih FFS

MKGP-UVHVVR | Izjava o dostopnosti | FITO-INFO | NEOX s.p., 2014 | BRON d.o.o. © 2024