

26. OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE KAPUSNIC - 21.04.2022 13:53 - Zaključeno



Pri pregledu posevka brokolija smo opazili kolonije *mokaste kapusove uši*. Na začetku pojava jih najdemo v srčnih listih, ki so odvisno od vrste in sorte kapusnice rumeno ali vijolično obarvani. Ob močnem napadu zelje ne oblikuje glav. Če ste pri pregledu svojih posevkov ugotovili pojav mokaste uši, lahko uporabite enega od pripravkov:

CLOSER v odmerku 2 ml/100 m², uporaba v brokoliju, brstičnem ohrovtu, zelju, kitajskem zelju,

- **RAPTOL KONCENTRAT** v odmerku 6 l/ha, uporaba v kolerabici,
- **NEEMAZAL - T/S** v odmerku 3,0 l/ha, uporaba v zelju, ohrovtu in brstičnem ohrovtu,
- **KARATE ZEON 5 CS** v odmerku 0,15 l/ha, uporaba v brstičnem ohrovtu, zelju in redkvici,
- **MOVENTO SC 100** v odmerku 0,75 l/ha, uporaba v brokoliju, cvetači, brstičnem ohrovtu, zelju, glavnatih in listnem ohrovtu, kitajskem zelju in kolerabici,
- **PIRIMOR 50 WG** v odmerku 0,42 kg/ha, uporaba v brstičnem ohrovtu in glavnatem zelju.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 21.04.2022 13:53

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: PETERLIN Andreja

Pripravila: **Peterlin Andreja**

[Seznam registriranih FFS](#)

