

24. VARSTVO AMERIŠKIH BOROVNIC - 21.04.2022 15:25 - Zaključeno



Zgodnje sorte ameriških borovnic, na pretežnem delu opazovanih lokacij, že začenjajo cveteti. V tem razvojnem stadiju je izjemno pomembno varstvo odprtih cvetov pred sekundarnimi okužbami z monilijo ameriških borovnic. Zaradi hladnega in relativno suhega vremena letos razmere za razvoj apotecijev niso bile ugodne. Kljub temu smo v nekaterih nasadih opazili primarne okužbe na zelenih poganjkih. Na sortah, ki že cvetijo priporočamo uporabo enega izmed fungicidov: **Signum**, **Teldor SC 500** ali **Serenade ASO**. Na sortah, ki so še v fazi brstenja pa lahko uporabite ali **Score 250 EC** ali **Mavita 250 EC** ali **Folicur EW 250**. Ob tem je potrebno cvetove borovnic zavarovati tudi pred okužbami z nekaterimi drugimi povzročitelji bolezni kot sta antraknoza in siva plesen. Za zatiranje sive plesni so registrirani fungicidnih pripravki **Teldor SC 500**, **Serenade ASO**, **Switch 62,5 WG**, **Amylo-X**, **Signum** in **Taegro**. Slednja dva delujeta tudi proti antraknozi. Škropljenje opravite tik pred napovedanimi padavinami.

Pred uporabo preberite sredstvom priložena navodila in veljavne registracije ter jih upoštevajte!

Datum objave obvestila: 21.04.2022 15:25

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: SNOJ David

Pripravil: **David Snoj**

Seznam registriranih FFS

