



44. OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE KAPUSNIC - 20.05.2022 13:56 - Zaključeno



Na več lokacijah, kjer se pridelujejo različne kapusnice, smo opazili poškodbe *kljunotaja* (*Ceutorhynchus pleurostigma*). Škodo povzročajo ličinke, katero boste našli v stebelu ali v debelejših listnih žilah rastline. Rastline zaradi izjedenih stebel tudi značilno polegajo. V primeru, da opazite ličinke v vaših posevki, uporabite pripravek: **KARATE ZEON 5 CS** v odmerku 0,15 l/ha.

Na posevkih zelja, ki so bili šele posajeni, opazamo pojav *kapusovih bolhačev* (*Phyllotreta sp.*). Kjer so rastline še zelo majhne, priporočamo zaščito s pripravkom: **KARATE ZEON 5 CS** v odmerku 0,15 l/ha, **DECIS 100 EC** v odmerku 63 ml/ha ali **LASER PLUS** v odmerku 0,2 l/ha.

Ugodne temperature vplivajo tudi na razvoj različnih gosenic na kapusnicah (*kapusovega belina*, *repnega belina*, *kapusovega molja*,...). V primeru, da jih tudi sami opazite na svojem posevku, priporočamo zaščito z enim od naslednjih pripravkov: **AFFIRM** v odmerku 1,5 kg/ha, uporaba na prostem na zelju, brokoliju in cvetači, **KARATE ZEON 5 CS** v odmerku 0,2 l/ha, uporaba na zelju, brstičnem ohrovt, **MIMIC** v odmerku 0,3-0,4 l/ha uporaba na brokoliju, glavnatem zelju, glavnatem ohrovtu, kitajskem kapusu in listnem ohrovtu, gojenih na prostem, **STEWART** v odmerku 85 g/ha, uporaba na zelju, cvetači, brstičnem ohrovtu, rdečem zelju in brokoliju, **STEWART OPZ** v odmerku 85 g/ha uporaba na brstičnem ohrovtu, brokoliju, **LEPINOX PLUS** v odmerku 1 kg/ha, uporaba na brokoli, ohrovt, glavnato zelje, kitajski kapus, brstični ohrovt, **DELFIN WG** v odmerku 0,5 kg/ha, uporaba na kapusnicah, **NEEMAZAL – T/S** v odmerku 3,0 l/ha, uporaba na zelju, ohrovtu in brstičnem ohrovtu na prostem, **DECIS 100 EC** v odmerku 75 ml/ha, na zelju, cvetači, brstičnem ohrovtu, **CORAGEN** v odmerku 125 ml/ha, v cvetači, brokoliju, glavnatem zelju in ohrovtu, **BENEVIA** v odmerku 0,4 - 0,5 l/ha v cvetači, brokoliju, glavnatem zelju ter brstičnem ohrovtu, **VOLIAM** v odmerku 125 ml/ha, v cvetači, brokoliju, glavnatem zelju in ohrovtu.

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.

Datum objave obvestila: 20.05.2022 13:56

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: PETERLIN Andreja

Pripravila: **Peterlin Andreja**

Seznam registriranih FFS

