

Severovzhodna Slovenija - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor / Žita

/ 44. OBVESTILO O ZATIRANJU GLIVIČNIH ŠKODLJIVCEV NA ŽITIH OBVESTILO O ZATIRANJU ŠKODLJIVCEV NA ŽITIH

44. OBVESTILO O ZATIRANJU GLIVIČNIH ŠKODLJIVCEV NA ŽITIH OBVESTILO O ZATIRANJU ŠKODLJIVCEV NA ŽITIH - 25.05.2022 20:41 - Zaključeno



Na posevkih žit so na nekaterih lokacijah še vedno močno prisotne ličinke **rdečega listnega strgača**, še vedno je mogoče najti jajčeca in odrasle hroščke. Na nekaterih posevkih žit je prag škodljivosti presežen, ki znaša 10 ličinka na m². Nujno preglejte vaše posevke žit, predvsem na ovsu in če je prag presežen, ustrezno ukrepajte.

Opazamo tudi večje populacije **uši na listih ter klasih žit**. Prag škodljivosti znaša, ko je na klasu povprečno od 5 do 8 uši na klas v času cvetenja ali 7 do 10 uši na klas v sredini mlečne zrelosti ali, ko imamo z ušmi naseljeno več kot 20% klasov v času cvetenja ali, ko imamo z ušmi naseljeno več kot 30% klasov v času mlečne zrelosti. Stopnja parazitiranosti uši na naših žitnih njivah je dokaj visoka, zato ne smemo prehitro pristopiti h zatiranju in pri tem uničiti večji del naravnih sovražnikov uši. Pri uporabi insekticidov moramo paziti na karenci, ki traja od 21 do 42 dni.

Preglednica : Seznam insekticidov registriranih v žitih

SREDSTVO	ODMEREK	ČAS UPORABE	REGISTRIRAN ZA SLEDEČE ŠKODLJIVCE
PIRETROIDI TIPA I			
Evure (Tau-fluvalinat 24%)	0,2 L/ ha	Tretira se ob pojavu škodljivih žuželk, ko je presežen prag škodljivosti	ozimni in jari pšenici, tritikali ter rži za zatiranje listnih uši (Aphididae) ter žitnih strgačev (Oulema spp.)
Mavrik 240 EW (tau-fluvalinat 24%)	0,2 L na ha	insekticid z kontaktnim in želodčnim delovanjem. Tretira se, ko je presežen gospodarski prag škode	ozimni in jari pšenici, tritikali ter rži za zatiranje listnih uši (Aphididae) ter žitnih strgačev (Oulema spp.)
PIRETROIDI TIPA II			
Decis 2,5 EC (deltametrin 2,5 %)	0,3 L/ha	dotikalni insekticid, s sredstvom se prvič tretira, ko je presežen prag škodljivci	v strnih žitih za zatiranje listnih uši (Aphididae) in rdečega žitnega strgača (Oulema melanopus)
Decis 100 EC (deltametrin 10 %)	63 ml - 75 ml/ha	Tretiranje se opravi ob pojavu škodljivih žuželk oziroma, ko je presežen prag škodljivosti.	v ozimni in jari pšenici, ozimnem in jarem ječmenu ter v ozimnem in jarem ovsu za zatiranje listnih uši (Aphididae) na klasu
Delux 050 CS (deltametrin 5%)	0,1 l/ha	Tretiranje se opravi ob pojavu škodljivih žuželk oziroma, ko je presežen prag škodljivosti.	Ozimni pšenici za zatiranje žitnih strgačev (Oulema spp.)
Fasthryn 10 EC (alfa-cipermetrin 10%) (zaloge v uporabi do 7.12.22)	0,1 L/ha ob porabi 200 do 500 L vode na ha.	S sredstvom se tretira v razvojni fazi, ko so prisotni cvetni brsti še vedno obdani z listi (BBCH50), do razvojne faze, ko so vidni prvi venčni listi, cvetni brsti so še vedno zaprti –rumeni brst (BBCH 59)	v pšenici, ječmenu, rži, tritikali in ovsu za zatiranje velike žitne uši (Sitobion avenae)
Karate zeon 5 CS (lambda-cihalotrin 5%)	0,15 L na ha	dotikalni insekticid z želodčnim in odvračalnim delovanjem, se sredstvo uporabi ob prvem pojavu škodljivih žuželk.	Pšenici, ječmenu, rži, ovsu in tritikali za zatiranje rdečega žitnega strgača (Oulema melanopus) in listnih uši (Aphididae)
Karis 10 CS (lambda-cihalotrin 10%) (zaloge v uporabi do 5.11.22)	50 mL/ha	Tretira se v času cvetenja, ko populacija strgača doseže prag gospodarske škode.	V pšenici, ječmenu in ovsu za zatiranje listnih uši (Aphididae) in rdečega žitnega strgača (Oulema melanopus)
Poleci	0,3 L/ha	dotikalni (kontaktni) in želodčni	na strnih žitih za zatiranje listnih uši (Aphididae)

(deltametrin 2,5 %)		insekticid. S sredstvom se prvič tretira, ko je presežen prag škodljivosti oziroma v skladu z napovedjo opazovalno službe	in rdečega žitnega strgača (Oulema melanopus)
Teppeki Afinto (flonikamid)	0,14 kg /ha	Deluje sistemsko in translaminarno. Zatira se, ko je presežen prag škodljivosti.	V pšenici, rži, ječmenu in ovsu in tritikali za zatiranje listnih uši (Aphididae)
Pirimor (pirimikarb)	0,3 kg/ha	Deluje kontaktno in translaminarno. Zatira se, ko je presežen prag škodljivosti.	V ozimni in jari pšenici, ozimnem in jarem ječmenu, ovsu, rži in tritikali za zatiranje listne uši.

Pred uporabo posameznih fitofarmacevtskih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo. Upoštevati je potrebno predpisane razdalje od voda 1. in 2. reda. Upoštevajte dobro kmetijsko prakso varstva rastlin s poudarkom na varovanju čebel ter na vodenje evidenc o uporabi fitofarmacevtskih sredstev, ki jih je treba hraniti tri leta. Hraniti morate tudi račune o nabavi FFS.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 25.05.2022 20:41
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: **Jože Miklavc**
[Seznam registriranih FFS](#)

