



40. VARSTVO ČEŠENJ IN VIŠENJ - 30.05.2022 10:30 - Zaključeno



Zgodnje sorte češenj že zorijo, medtem ko plodovi večine poznejših sort postopoma dobivajo značilno barvo. Ob začetku barvanja plodov češenj in višenj je čas za postavitev rumenih lepljivih plošč za spremljanje naleta češnjeve muhe. Plošče namestite na južno stran krošenj. Ob ugotovitvi naleta mušice lahko opravite zatiranje z uporabo insekticidov. Priporočljivo je obesiti najmanj dve plošči na hektar nasada. Prag zatiranja je presežen, da se na posamezno ploščo ulovi vsaj ena muha. Za zatiranje češnjeve muhe so na voljo insekticidi: **Exirel**, **Imidan 50 WG**, **Mospilan 20 SG** ali **Naturalis**, ki je dovoljen tudi v ekološki pridelavi in nima karenčne dobe. Ob škropljenju je priporočljivo dodajanje beljakovinske vabe **Nutrel**, ki privablja češnjevo muho, zato lahko z mešanico insekticida poškropite le del krošnje, ki je izpostavljen sončni svetlobi. V krošnje dreves lahko namestite tudi insekticidno vabo **Decis Trap češnjeva muha**, ki privablja škodljivca in zmanjšuje napadenost plodov. Priporočljiva gostota pasti znaša 100 vab/ha.

Zoreče plodove napada tudi **plodova vinska mušica**, ki odlaga jajčeca v plodove, škodo pa povzročajo ličinke, ki se prehranjujejo v notranjosti plodov in jih spreminjajo v kašasto gmoto. Posledice prehranjevanja ličnik so tudi pogostejše okužbe z navadno sadno gnilobo. Trenutne vremenske razmere so sicer manj ugodne za razvoj škodljivca, kar pa se lahko v primeru dežja hitro spremeni. Pridelovalcem svetujemo, da v nasadih češenj in višenj postavijo prehranske vabe s pomočjo katerih lahko spremljajo pojav škodljivca.

Ob pogostih padavinah v času zorenja obstaja nevarnost okužb plodov z **navadno sadno gnilobo**. Zato spremljajte vremenske napovedi in v primeru napovedi dolgotrajnejših padavin opravite škropljenje tik pred dežjem. Uporabite lahko enega izmed registriranih pripravkov kot so **Luna experience**, **Prolectus**, **Signum**, **Switch 62,5 WG**, **Revyona** ali **Teldor 500 SC**. Ekološki sadjarji lahko uporabite pripravke na podlagi mikroorganizmov kot so **Amylo-X**, **Serenade ASO** ali **Taegro**.

Pri škropljenju v času zorenja plodov bodite pozorni na karenčne dobe pripravkov! Zaradi varstva čebel škropljenje z insekticidi opravite zgodaj zjutraj in pozno zvečer, ko so čebele v panjih. Pred škropljenjem odstranite cvetočo podrast!

Datum objave obvestila: 30.05.2022 10:30

Obvestilo prognošičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: David Snoj, Primož Žigon, Meta Zemljič

Pripravili: **David Snoj, Primož Žigon. Uredila: Meta Zemljič**

Seznam registriranih FFS

