



55. Varstvo česna pred česnovo rjo - 06.06.2022 07:25 - Zaključeno



Pridelovalce česna obveščamo, da se v posevkih česna začela pojavljati česnovo rja. Bolezenska znamenja česnove rje je mogoče opaziti na spodnjih listih v manjšem obsegu, vendar lahko ob ugodnih vremenskih razmerah pričakujemo okužbe v večjem obsegu. Za zatiranje česnove rje je registriran so registrirani sledeči pripravki:

Previdni pripravki	Priloge uporabe	odmerki v kg/ha	časovna razdoba	Previdni pripravki in razdoba med tretiranjimi v /
azoksistrobin	Zoxis 250 SC	1 L/ha	7 dni za česen,	Česen - tretira se od razvojnega faze, ko je razvit 4. pravi list, do razvojne faze, ko je upognjenih 50 % listov (BBCH 14-48). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranjimi mora biti najmanj 7 dni.
azoksistrobin	Charisma SC	1,0 L/ha	21 dni	Por - Tretira se od razvojne faze, ko je razvit 6. pravi list, do razvojne faze, ko je upognjenih 50 % listov v poru (BBCH 16-48). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranjimi mora biti najmanj 12 dni.
azoksistrobin	Zoxis 250 SC	1,0 L/ha	14 dni za česen, 21 dni za por	Česen - Tretira se od razvojne faze, ko je razvit 4. pravi list, do razvojne faze, ko je upognjenih 50 % listov (BBCH 14-48). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranjimi mora biti najmanj 7 dni.
difenokonazol + fluksapiroksad	Sercadis plus – manjše uporabe	1 L/ha	7 dni za česen, 14 dni za por	Por - Tretira se od fenološke faze, ko je doseženo 10% listne mase (BBCH 41), oziroma na začetku okužbe (ob pojavu prvih vidnih simptomov bolezni). Na istem zemljišču sta dovoljeni 2 tretiranjimi v eni rastni dobi. Razmik med tretiranjimi naj bo 14-21 dni.
difenokonazol + fluksapiroksad	Sercadis plus – manjše uporabe	1 L/ha	dni	Por in spomladanska čebula. V fenološki fazi od razvitega tretjega lista do faze, ko je dosežena značilna listna masa (BBCH 13-49). S sredstvom se lahko na istem zemljišču v eni rastni sezoni tretira največ dvakrat. Časovni interval med tretiranjimi naj bo najmanj 7 dni, odvisno od vremenskih razmer.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 06.06.2022 07:25

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MIKLAVC Jože

Pripravil: **Jože Miklavc**

Seznam registriranih FFS

