



Osrednja Slovenija - Kmetijski inštitut Slovenije / Vinska trta / 54. VARSTVO VINSKE TRTE

54. VARSTVO VINSKE TRTE - 20.06.2022 13:11 - Zaključeno



V večini vinogradov je cvetenje zaključeno. Prirast mladik vinske trte je še naprej intenziven, zato je potrebno nadaljevati s preventivnim varstvom. Po cvetenju se povečuje tudi nevarnost za pojav **oidija**, ki lahko povzroči poškodbe na mladih grozdcih. Aktualne vremenske razmere so zelo ugodne za razvoj bolezni. Za preprečevanje okužb svetujemo redno uporabo sistemičnih fungicidov v približno 10 dnevnih razmikih. Na voljo so naslednji registrirani pripravki: **Collis, Custodia, Difcor 250 EC, Domark 100 EC, Dynali, Folicur EW 250, Luna experience, Luna max, Mavita, Misha 20 EW, Mystic 250 EC, Nativo 75 WG, Orius 25 EW, Prosper CS 300 Revyona, Score 250 EC, Sercadis, Spirox D, Talendo extra, Tebusha 25% EW, Topas 100 EC, Topaze, Unicorn DFin Vivando**. Za izboljšanje kontaktnega delovanja poleg sistemičnih fungicidov priporočamo tudi redno uporabo **žvepla**. V ekološki pridelavi za varstvo pred oidijem poleg žvepla lahko uporabite tudi pripravke na osnovi kalijevega hidrogenkarbonata kot sta **Karbicure** ali **Vitisan**. Na voljo so tudi pripravki na osnovi mikroorganizmov: **AQ 10, Sonata in Taegro**.

Nevarnost za pojav **peronospore** se zaradi vročega in suhega vremena v večini vinogradov postopoma zmanjšuje. V primeru plohin neviht, ki povzročajo, da je listje dalj časa mokro, se lahko pogoji za širjenje okužb hitro izboljšajo. Problematični so lahko zlasti vinogradi, kjer so bolezenska znamenja že prisotna. Svetujemo ponovno uporabo pripravkov s kombiniranimi kontaktnimi in sistemičnim oz. polsistemičnim delovanjem kot so **Ampexio, Cymbal, Emendo F, Enervin, Equation pro, Folpan gold, Forum star, Magma triple, Mikal flash, Mikal premium F, Momentum F, Momentum trio, Orondis, Orvego, Pergado D, Pergado F, Pergado SC, Profiler, Reboot, Revus, Sanvino, Sfinga extra WDG Tanos 50 WG, Twingo, Valis F ali Zorvec zelavin**. V ekološki pridelavi za varstvo pred peronosporo uporabite fungicid na osnovi **bakra**. Pri uporabi kontaktnih pripravkov škropljenja izvajajte v približno tedenskih časovnih intervalih.

V primeru poškodb vinogradov zaradi toče je priporočljiva prednostna uporaba pripravkov, ki vsebujejo a.s. folpet kot so na primer **Forum star, Sfinga extra WDG, Pergado F, Folpan gold, Mikal flash** ipd.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

Datum objave obvestila: 20.06.2022 13:11

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: ŽIGON Primož

Pripravil: **Primož Žigon**

Seznam registriranih FFS



MKGP-UVHVR | Izjava o dostopnosti | FITO-INFO | NEOX s.p., 2014 | BRON d.o.o. © 2024