

80. VARSTVO MARELIC, BRESKEV IN NEKTARIN - 30.06.2022 15:06 - Zaključeno



V času zorenja marelic, breskev in nektarin svetujemo preventivno varstvo pred **sadno gnilobo**. Uporabite lahko: **SIGNUM** (0,75 kg/ha), **MAMTA 250 EC** (0,45 l/ha), **PROLECTUS** (1,2 kg/ha), **LUNA EXPERIENCE** (0,6 l/ha), **CHORUS 50 WG** (0,6 kg/ha), **SCORE 250 EC** (0,45 l/ha), **SWTCH 62,5 WG** (1 kg/ha), **TELDOR SC 500** (1 l/ha), oz. pripravke, ki zmanjšujejo možnost okužb in so sprejemljivi tudi v ekološki pridelavi: **AMYLO-X** (1,5 – 2,5 kg/ha), **TAEGRO** (0,185-0,37 kg/ha), **KARBICURE** (5 kg/ha; tretira se od razvojne faze, ko večina plodov doseže 90 % končne velikosti ploda (BBCH 79), do faze užitno zrelih plodov (BBCH 89).

Sicer pri srednje poznih in poznih sortah breskev in nektarin (razvoj na stopnji 75 po lestvici BBCH) še vedno priporočamo pristopanje proti **breskovi pepelovki**. V poštev pridejo pripravki na osnovi žvepla: **AZUMO WG**, **COSAN**, **KUMULUS DF**, **MICROTHIOL SPECIAL**, **MICROTHIOL DISPERS**, **PEPELIN**, **THIOMT JET**, **VINDEX 80 WG** v odmerkih 5 – 7,5 kg/ha ali **VERTPIN**, **POL-SULPHUR 800 SC**, **BIOTIP SULFO 800 SC**, **SYMBIOTICA FITO – TEKOČE ŽVEPLO** v odmerku 6 l/ha,... Na razpolago so tudi **SCORE 250 EC** (0,45 l/ha), **MAVITA 250 EC** (0,45 l/ha) ali **SERCADIS** (0,15 l/ha).

Prej navedena **SREDSTVA NA OSNOVI ŽVEPLA** učinkujejo tudi proti **breskovemu škrlupu**.

Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 30.06.2022 15:06

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

