



83. VARSTVO VINSKE TRTE - 07.07.2022 12:43 - Zaključeno



V vinogradih poteka pospešen razvoj grozdov; jagode se med seboj dotikajo (77 – 79 po lestvici BBCH).

Za zagotavljanje zdravega stanja pridelka je poleg varstva s kemičnimi sredstvi potrebno sočasno skrbeti tudi za ustrezno zračnost, posebno v predelu grozdov.

Nevarnost širjenja okužb **peronospore vinske trte** je velika. Kjer so prisotne okužbe, svetujemo varstvo pridelka s sredstvi s kombiniranim načinom delovanja: **EQUATION PRO** (400 g/ha; zaloge v uporabi do 16.09.2022), **TANOS 50 WG** (0,4 kg/ha; zaloge v uporabi do 16.09.2022), **FOLPAN GOLD** (2,5 kg/ha od konca cvetenja do faze, ko se grozdne jagode strnejo), **FORUM STAR** (1,6 kg/ha), **SFINGAEXSTRAWDG** (1,5 kg/ha od BBCH 53-75) in 2 kg/ha od BBCH 76), **TWINGO** (3 kg/ha), **REBOOT** (0,4 kg/ha), **AMPEXIO** (0,5 kg/ha), **CYMBAL** (največ 0,25 kg/ha), **VALIS F** (2 kg/ha),... V vinogradih s stabilnim zdravstvenim stanjem pridejo v poštev pripravki kot so: **SANVINO** (1,125 kg/ha od BBCH 71 in 1,5 kg/ha do BBCH 83 za vinsko grozdje in od BBCH 75 – 79 za namizno), **DELAN PRO** (3 l/ha), **PERGADO F** (3 kg/ha), **PERGADO D** (1,4 l/ha), **DAIMOY F** (2,5 l/ha; veljavnost do 31.7.2022), **VIDERYO F** (2,5 l/ha; veljavnost do 31.7.2022), **VINCYA F** (2,5 l/ha; veljavnost do 31.7.2022), **MILDICUT** (4 l/ha; veljavnost do 31.7.2022), **DELAN PRO** (3 l/ha), **FOSHIELD** (samostojno v šestih zaporednih tretiranjih v odmerku 1-4 l/ha, odvisno od razvojne stopnje faze trte v času tretiranja...),... Kjer opazate izrazito bujnost rasti, svetujemo rabo pripravkov v kombinaciji z bakrom: **PERGADO C** (4 – 5 kg/ha), oz. **pripravke na osnovi bakra: BADGE WG** (2,5 kg/ha), **CUPRABLAU Z 35 WG** (3 kg/ha), **CUPRABLAU Z 35 WP** (3 kg/ha), **CUPROXAT** (5,3 l/ha), **KOCIDE 2000** (2 kg/ha), **NORDOX 75 WG** (1,6 kg/ha).

Proti **oidiji vinske trte** ukrepajte z enim od sredstev kot so: **NATIVO 75 WG** (0,16 kg/ha; veljavnost do 31.8.2022), **SPIROX D** (0,5 l/ha; do začetka stikanja jagod), **KARATHANE GOLD 350 EC** (0,5 – 0,6 l/ha), **TALENDO EXTRA** (ko so večina jagod med seboj dotika: 0,2-0,4 l/ha), **TALENDO** (0,25 l/ha), **SERCADIS** (0,15 l/ha), **KUSABI 300 SC** (0,3 l/ha), **MAMTA 250 EC** (0,2 l/ha), **MISHA 20 EW** (0,23 l/ha; zaloge v uporabi do 30.11.2022), **ORIUS 25 EW** (0,4 l/ha), **DYNALI** (0,65 l/ha), **VIVANDO** (0,2 l/ha; do zapiranja grozdov - BBCH 79), **PROSPER CS 300** (1 l/ha), **DOMARK 100 EC** (0,3 l/ha), **TOPAS 100 EC** (0,3 l/ha), **SCORE 250 EC** (0,2 l/ha), **DIFCOR 250 EC** (0,12 l/ha), **UNICORN DF** (2,2 kg/ha), **COLLIS** (0,4 l/ha),...

Priporočen razmik med tretiranjimi naj bo v tem obdobju na 7 do 10 dni.

Preden se jagode strnejo in grozd zapre, je potrebno poskrbeti za preventivno varstvo pred **sivo plesnijo**. Za ta namen priporočamo: **CANTUS** (1,2 kg/ha), **MYTHOS** (2,5 l/ha), **PROLECTUS** (1,2 kg/ha), **PYRUS 400 SC** (2 l/ha), **SCALA** (2 l/ha), **ZENBY** (1,5 l/ha), **SWITCH 62,5 WG** (1 kg/ha), **TELDOR SC 500** (1,5 l/ha). V poštev pridejo tudi sredstva z antagonističnim delovanjem: **AMYLO - X** (1,5 – 2,5 kg/ha), **SERENADE ASO** (4 l/ha), **BOTECTOR** (1 kg/ha), **TEAGRO** (0,37 kg/ha) ali **POLYVERSUM** (0,25 kg/ha). Na zmanjševanje okužb imajo vpliv tudi **KARBICURE** (5 kg/ha), **OROCIDE PLUS** (6,4 l/ha) in **PREV-GOLD** (6,4 l/ha). Vseh osem je primernih za ekološko pridelavo.

V povezavi s preprečevanjem pojava **sive plesni** je v tem obdobju potrebno preprečiti poškodbe jagod, ki jih povzročajo gosenice drugega rodu **grozdnih sukačev**. Uporabite lahko: **LEPINOX PLUS** (1 kg/ha), **DELFIN WG** (0,75 kg/ha), **AGREE WG** (0,75 kg/ha), **LASER PLUS** (0,2 l/ha), **CORAGEN** (150 ml/ha), **VOLIAM** (150 ml/ha), **AFFIRM** (1,5 kg/ha),... Prvi štirje so primerni tudi za ekološko pridelavo.

V primeru **neurja s točo** je potrebno najprej počakati, da se vinograd osuši, potem uporabite pripravke **na osnovi aktivne snovi folpet** (Follow 80 WG, Folpan 80 WDG, Pergado F, Twingo,...) ali **BAKROVE PRIPRAVKE**.

Pri rednem spremljanju razvoja **ameriškega škrdatka**, prenašalca karantenske bolezni **zlata trsna rumenica**, beležimo prisotnost večine ličink na razvojnih stopnjah L4 in L5. Še vedno se pojavljajo ličinke L3; **nekaj dni so prisotni tudi odrasli škrdatki**.

Sedaj je nastopil ustrezen čas za nameščanje rumenih lepljivih plošč za spremljanje odraslih škrdatkov! Podroben pristop njihovega spremljanja in zatiranja je predstavljen v drugem posebnem obvestilu.

Krajša video navodila lahko pogledate na YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?v=V4rCVbMFOSE>

Nanos FFS opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

