



93. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 18.07.2022 15:14 - Zaključeno



Plodovi jablan presegajo polovico končne velikosti (77 po lestvici BBCH).

Redno varstvo proti **jablanovemu škrlupu** lahko obnavljate na 10 do 14 dni, oz. prilagodite glede na morebitne padavine. Ob nevihtah z intenzivnimi nalivi (30 in več l/m²), ki hitro izperejo fungicidno oblogo, je potrebno nanos čim prej obnoviti. Priporočamo preventivna sredstva: **CAPTAN 80 WG** (2 kg/ha), **MERPAN 80 WDG** (1,88 kg/ha), **MERPLUS** (2 l/ha), **ORTHOCIDE 80 WG** (2 kg/ha), **SCAB 80 WG** (1,9 kg/ha), **SCAB 480 SC** (3,13 l/ha),... V ekološki pridelavi uporabite sredstvo **CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA** (6 l/ha na meter višine krošnje).

Poganjke okužene z **jablanovo pepelovko** izrezujte in ročno odstranjujte iz nasada. Priporočamo tudi redno dodajanje sredstev na osnovi žvepla (3 kg/ha, oz. l/ha).

V nasadih se kažejo znamenja okužb z **listnimi pegavostmi**. Dodatno lahko blažite simptome z **VITISAN** (5 – 7,5 kg/ha), ki učinkuje tudi proti **mušji pegavosti**.

Proti drugemu rodu **jabolčnega zavijača** svetujemo: **AFFIRM** (največ 4 kg/ha), **AFFIRM OPTI** (2 kg/ha), **CORAGEN** (18 ml/hl; 0,27 l/ha) ali **VOLIAM** (18 ml/hl), **DELEGATE 250 WG** (0,3 kg/ha; le 1× v rastni dobi), **LASER PLUS** (0,3 l/ha; le 1× v rastni dobi), oz. **MADEX MAX** (50 ml/ha na 1 m višine krošnje) ali **CARPOVIRUSINE** (1 l/ha). Slednji trije so primerni tudi v ekološki pridelavi. V primeru prerazmnožitve **listnih uši**, lahko uporabite pripravek **MOSPILAN 20 SG** (v 0,04 % konc., oz. 4 g na 10 l vode), ki stransko deluje tudi na zavijače.

Izvedba zaščite je smiselna zlasti iz vidika množičnosti naleta **drugih vrst zavijačev**. Zoper slednje lahko uporabite še sredstva na osnovi *Bacillus thuringiensis*: **LEPINOX PLUS** (1 kg/ha), **DELFIN WG** (0,75 kg/ha) ali **AGREE** (1 kg/ha).

Populacije **rdeče sadne pršice** in **navadne pršice** zasledimo v prisotnosti v vseh razvojnih stopnjah. Ob prerazmnožitvi uporabite: **VERTIMEC PRO** (1,125 l/ha), **SHIRUDO** (0,5 kg/ha), **MILBEKNOCK** (0,625 l/ha pri porabi vode 500 l/ha na 1 m višine krošnje), **KANEMITE SC** (0,625 l/ha pri porabi vode 500 l/ha na 1 m višine krošnje).

Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 18.07.2022 15:14

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

