



96. VARSTVO VINSKE TRTE - 25.07.2023 00:57 - Zaključeno



Vinska trta razvija grozdne jagode, katerih večina se med seboj dotika (79 po lestvici BBCH).

Varstvo pred **oidijem vinske trte** načrtujte s sredstvi kot so: **SERCADIS** (0,15 l/ha), **DYNALI** (0,65 l/ha), **CUSTODIA** (0,7 l/ha) **REVYONA** (1 l/10.000 m²) tretirane površine listne stene, največji dovoljeni odmerek 2 l/ha), **SPIROX D** (0,5 l/ha), **LUNA EXPERIENCE** (0,375 l/ha), **LUNA MAX** (1 l/ha), **SPIROX** (0,4 l/ha), **KARATHANE GOLD 350 SC** (0,5 l/ha), **TALENDO** (0,25 l/ha), **TALENDO EXTRA** (0,4 l/ha), **KUSABI 300 SC** (0,15 l/ha), **ORIUS 25 EW** (0,4 l/ha), **UNICORN DF** (2,2 kg/ha), **COLLIS** (0,4 l/ha),... V ekološki pridelavi lahko uporabite: **VTISAN** (3-12 kg/ha) ali **KARBICURE** (5 kg/ha), **AQ-10** (35 g/ha), **TAEGRO** (0,185-0,37 kg/ha), **SONATA** (5 l/ha), **FYTOSAVE** (2 l/ha),... in **pripravke na osnovi žvepla**.

V primeru varstva vinogradov pred **peronosporo vinske trte** svetujemo na legah s stabilnim zdravstvenim stanjem rabe pripravkov kot so: **PERGADO F** (3 kg/ha), **PERGADO D** (1,4 kg/ha), **PERGADO SC** (0,6 l/ha), **MILDICUT** (4 l/ha), **REVUS** (0,6 l/ha), **SANVNO** (1,5 kg/ha), **ENERVIN** (2,5 kg/ha), **ORONDIS** (0,6 l/ha), **ZORVEC ŽELAVIN** (0,6 l/ha), **FOLPAN 80 WDG** (1,9 kg/ha), **FOLLOW 80 WDG** (1,25 kg/ha), **SOLOFOL** (1,6 kg/ha). V vinogradih z bujno rastjo in s stabilnim zdravstvenim stanjem pride v poštev pripravek v kombinaciji z bakrom **PERGADO C** (4-5 kg/ha). Sicer lahko uporabite tudi enostavne **bakrove pripravke**: **BADGE WG** (2,5 kg/ha), **CUPRABLAU Z 35 WG** (3 kg/ha), **CUPRABLAU Z 35 WP** (3 kg/ha), **CUPRABLAU Z 50 WP** (2 kg/ha), **CUPROXAT** (5,3 l/ha), **NORDOX 75 WG** (1,6 kg/ha), **KOCIDE 2000** (2 kg/ha), ki pridejo v poštev tudi v ekološki pridelavi. Kjer je intenzivnost okužb še vedno velika, se izteka obdobje za njihovo zaustavitev s sredstvi s kombiniranim delovanjem: **SFINGA EXTRA WDG** (2 kg/ha), **FOLPAN GOLD** (2,5 kg/ha), **AMPEXIO** (0,5 kg/ha), **TWNGO** (3 kg/ha), **REBOOT** (0,4 kg/ha), **FORUM STAR** (1,6 kg/ha), **ORVEGO** (0,8 l/ha), **VALIS F** (2 kg/ha),... V zahtevnih razmerah je potrebno varstvo izvajati v krajsih razmikih, na 7-8 dni.

V primeru intenzivnejših padavin, ko pade več kot 25 mm/m², je potrebno fungicidni nanos nemudoma obnoviti.

V primeru neurja s točo so za zaščito vinogradov primera sredstva z aktivno snovjo **folpet** (Twingo, Forum star, Sfinga extra, Folpan gold, Pergado F, ...) ali **pripravki na osnovi bakra**. Visoke temperature ozračja pomagajo pri hitrejšem celjenju ran. Ob regeneraciji poškodovanih rastlin pomagajo tudi biostimulanti na osnovi alg, aminokislín in mikrohranil. V manj poškodovanih vinogradih sredstva za krepitev rastlin uporabite takoj, kjer pa je poškodovana večina listne površine, priporočamo njihov nanos ob ponovni vzpostavitvi vegetativne rasti.

V obdobju med 25. julijem in 05. avgustom je v jugovzhodni Sloveniji čas za izvedbo tretjega zatiranja ameriškega škržatka.
Podrobnosti si lahko ogledate na YouTube kanalu: https://www.youtube.com/watch?v=nQKb7RycQ_Q.

Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 25.07.2023 00:57

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

