

100. Zatiranje plevelov v žitih - 27.10.2023 14:48 - Zaključeno



Setev ozimnih žit je v glavnem zaključena, posevki so večinoma v obdobju razvoja prvih par listov, nekateri še vznikajo. Plevela lahko zatirate že v jesenskem obdobju ali počakate z ukrepom do pomladi. Bolj razširjeno je spomladansko zatiranje, vendar ima tudi jesenska raba herbicidov določene prednosti. Jeseni in zime so danes precej bolj tople kot so bile nekoč, kar omogoča posevkom razmeroma hitro rast že v jesensko-zimskih mesecih. Skupaj z žiti se razvijajo tudi pleveli. V dobro razvitih posevkih, zlasti na težjih tleh, je lahko spomladansko škropljenje težje izvedljivo in slabše učinkovito. To še posebej velja za njive, kjer so težave z enoletnimi travami, kot so navadni srakoperec, njivski lisičji rep ipd. Travnne plevela lahko učinkovito zatirate v začetnih obdobjih rasti, ko imajo razvit enega do tri liste, kasneje je učinkovitost herbicidov občutno slabša. Če se odločite za jesensko rabo herbicidov je najbolje uporabiti katerega od pripravkov s širokim spektrom delovanja, s kombiniranim delovanjem prek tal in listov, ki delujejo tudi na najpomembnejše širokolistne vrste kot so jetičniki, mrtva kopriva, plešec, njivska vijolica, plezajoča lakota in podobni. Škropljenje odsvetujemo v primeru ohladitve vremena, če padejo nočne temperature pod ledišče, dnevne pa ne dosežejo 5°C. Za dobro delovanje talnih herbicidov morajo biti njive lepo pripravljene, brez velikih grud, tla pa primerno vlažna.

Pred škropljenjem preberite in upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Herbicidi za jesensko zatiranje plevelov v žitih

Pripravek aktivna snov	Odmerek (kg, l/ha)	Podatki iz registracije	
		Žito* / čas rabe	Zatiranje
Alister new diflufenikan jodosulfuron mezosulfuron	1	P Jeseni oz. konec zime ali zgodaj spomladi, od dveh razvitih listov do konca razraščanja (BBCH 12-29)	Ozkolistni in širokolistni plevel
Bizon diflufenikan florasulam penoksulam	1	P, J, R, T, Pi Od prvega lista do razraščanja (BBCH 11-23), rž od prvega do četrtega lista (BBCH 11-14)	Jesensko zatiranje enoletnega širokolistnega plevela in navadnega srakoperca
Boxer prosulfokarb	5	P, J, R V jeseni pred vznikom ali po vzniku, ko imajo žita en list pa do začetka razraščanja (BBCH 11-21)	Ozkolistni in širokolistni pleveli
Flexidor izoksaben	0,25	P, J Od faze po setvi do razvitih treh listov (BBCH 00-13)	Enoletni širokolistni pleveli
Lector delta diflufenikan, florasulam	0,075 – 0,1	P, J, R, T V jeseni od dveh listov do dveh stranskih poganjkov (BBCH12-22) ali spomladi, od prvega stranskega poganjka do drugega kolena (BBCH 21-32)	Širokolistni pleveli
Sharpen 33 EC pendimetalin	3-5	P Pred vznikom posevka (BBCH00-09) ali takoj po vzniku (BBCH10-13) jeseni ali spomladi	Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli
Sharpen plus (staro ime Sharpen 40 SC)	2,5-4	P Pred vznikom posevka (BBCH 00-09) ali takoj po vzniku (BBCH 10-13)	Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli

pendimetalin		jeseni ali spomladi	
Trinity diflufenikan klorotoluron pendimetalin	2	P, J, R, T Od prvega do tretjega lista (BBCH 10-13)	Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli

*P-pšenica, J-ječmen, O-oves, R-rž, T-tritikala, Pi-pira

Datum objave obvestila: 27.10.2023 14:48
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Meta
Pripravila: **Meta Zemljič**
[Seznam registriranih FFS](#)

