

41. VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN - 19.04.2024 08:52 - Zaključeno



V nasadih breskev in nektarin se oblikujejo plodiči (71 – 72 po lestvici BBCH).

Pridelovalce opozarjamo na možne prerazmnožitve listnih uši. Pozorni bodite posebno na kolonije **sive breskove uši**, ki ima prag škodljivost 3 % naseljenih brstov pred cvetenjem, oz. 7 % napadenih poganjkov po cvetenju (nektarine 3 % napadenih poganjkov). Ukrepace lahko s pripravki kot so: **AFINTO** (0,14 kg/ha), **TEPPEKI** (0,14 kg/ha), **MOSPILAN 20 SG** (0,04 % konc.), **PIRIMOR 50 WG** (0,75 kg/ha), **NEEMAZAL – T/S** (1,5 l/ha na meter višine krošnje, ki je primeren tudi za ekološko pridelavo),... Pripravek **ASSET FIVE** (0,96 l v 1500 l vode) ima dovoljenje za nujne primere prerazmnožitev listnih uši.

Za kvalitetnejši nanos poskrbite, da se aplikacija izvaja v mirnem vremenu. Priporočamo, da jo opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 19.04.2024 08:52

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

