

33. OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV št.10 - 29.04.2024 07:58 - Zaključeno



Zgodnje sorte jablan so na večini lokacij SV Slovenije dosegle fenološko fazo: plodiči veliki med 10 in 20 mm (BBCH 71-72).

JABLANOV ŠKRLUP

V obdobju od 22. do 26. aprila je v Mariboru padlo 40 mm padavin, kar je kljub nizkim temperaturam zaradi dolgotrajne omočenosti listja (preko 80 ur) omogočilo močno okužbo z **jablanovim škrlupom**. Ob naslednjih padavinah lahko ponovno pričakujemo izbruhe askospor in tudi nove primarne okužbe, zato priporočamo, da škropljenje opravite **še pred napovedanimi padavinami**.

Za škropljenje proti **jablanovemu škrlupu** priporočamo uporabo enega od kontaktnih ali površinskih fungicidov: aktivna snov (a.s.) metiram (**Polyram DF**, uporaba zalog do 28.11.2024), ali pripravkov na osnovi ditianona (**Delan 700WG**, **Delan PRO**, **Alcoban**) (Uporaba aktivne snovi **ditianon** v jabolkah in hruškah ne sme presegati skupne količine 2625 g aktivne snovi na ha v eni rastni dobi) ali pripravke na osnovi kaptana (**Captan 80 WG**, **Merpan 80 WDG**, **Merplus**, **Orthocide 80 WG**, **Scab 80 WG**, **Scab 480 SC**) ali dodina: **Syllit 400 SC** (Sredstva **Syllit** se ne sme mešati z močljivimi žvepli, bordojsko brozgo, s sredstvi, ki vsebujejo aktivne snovi kaptan, fenoksikarb, cink ali baker, apno, s sredstvi alkalne pH reakcije ter foliarnimi gnojili na osnovi morskih alg, cinka ali bakra. O možnostih mešanja z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi se je treba posvetovati z imetnikom registracije oziroma zastopnikom)).

V kolikor škropljenje pred napovedanimi padavinami ne bo mogoče, ga je potrebno opraviti takoj po končanih padavinah oz. najkasneje v času 24 ur. V tem primeru je mogoče uporabiti enega od naslednjih pripravkov:

ANILINOPIRIMIDINI	IBE oz. SDHI FUNGICIDI
◦ Faban (1,2 L/ha) ◦ Chorus 50 WG (0,45 kg/ha) Chorus forte (3,6 L/ha)	◦ Difcor 250 EC (0,2 L/ha) ◦ Difol (3,5 L/ha) ◦ Duaxo koncentrat (1,1 L na višinski meter krošnje/ha, najvišji dovoljeni odmerek pri enem tretiranju ne sme presegati 3,3L/ha)
◦ Scala (1,125 L/ha) ◦ Avalon (1,125 L/ha) ◦ Laitane (1,125 L/ha) ◦ Erune 40 SC (1,125 L/ha) ◦ Pretil (1,125 L/ha)	◦ Mavita 250 EC (0,2 L/ha) ◦ Revyona (največ 2 L/ha) ◦ Score 250 EC (0,2 L/ha) ◦ Sercadis (0,25 – 0,3 L/ha) ◦ Sercadis plus (1,2 L/ha) ◦ Domark 100 EC (0,4 L/ha)

Sredstev Avalon, Laitane, Erune in Pretil ni dovoljeno mešati z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi. Ostalim naštetim pripravkom je potrebno dodati še enega od zgoraj naštetih kontaktnih pripravkov, razen pripravkom Chorus forte, Faban in Difol.

V **ekološki pridelavi** je mogoče uporabiti tudi pripravek **Curatio – žvepleno apnena brozga**, ki ima tudi letos dovoljenje za nujne primere, smejo pa ga uporabljati samo poklicni pridelovalci, ki so registrirani za ekološko pridelavo.

Proti jablanovi pepelovki priporočamo pri **temperaturi nad 15°C** dodajanje enega izmed pripravkov na osnovi močljivega žvepla v priporočenih odmerkih:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| ◦ Azumo | ◦ Pepelin |
| ◦ Cosan | ◦ Sulfar |
| ◦ Kumulus DF | ◦ Thiovit jet |
| ◦ Microthiol disperss | ◦ Vertipin |
| ◦ Microthiol special | ◦ Vindex 80 WG |

V nasadih, kjer je **jablanova pepelovka** močno prisotna, priporočamo dodajanje pripravkov, kot so:

- | | |
|-------------------|----------------|
| ◦ Luna experience | ◦ Stroby WG |
| ◦ Sercadis | ◦ Zato 50 WG |
| ◦ Sercadis plus | ◦ Topas 100 EC |

Sercadis in Sercadis plus imata delovanje tudi na jablanov škrlup

Zaradi nizkih temperatur so bili ulovi metulčkov **jabolčnega zavijača** na feromonskih vabah v zadnjem tednu nekoliko manjši. O optimalnih terminih zatiranja jabolčnega zavijača vas bomo pravočasno obvestili.

Opozarjamo tudi na redno spremljanje populacije **rdeče sadne pršice**, **mokaste uši**, **listnih uši** in **krvave uši** ter ob preseženem pragu škodljivosti njihovo zatiranje z enim od dovoljenih pripravkov.

Opozarjamo na redno spremljanje pojava **hruševega ožiga**. Potrebno je pregledovati nasade jablan, predvsem mlade nasade, ki dolgo pocvetajo (simptomi; sušenje in venenje poganjkov ter mladih plodičev, ter pojav simptomov na tistih drevesih, kjer se je hrušev ožig pojavil že v preteklih letih). Prav tako bodite pozorni tudi na pojav simptomov pri okrasnih rastlinah (panešplja, ognjeni trn, jerebika, šmarna hrušica, glog). Ob pojavu bolezni lahko obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali javno službo za varstvo rastlin (Kmetijsko gozdarski zavod Maribor; 02/228 49 34).

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno PREBRATI IN UPOŠTEVATI NAVODILA ZA UPORABO, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 29.04.2024 07:58

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MEŠL Miro

Pripravil: **Miro Mešl**

Seznam registriranih FFS

